

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ОЧАГАХ ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ИНФЕКЦИИ

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 21.03.2003 Г. № 109 «О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИМ МЕРОПРИЯТИЯМ В ОЧАГАХ ТУБЕРКУЛЕЗА

ПОСТАНОВЛЕНИИ ГЛАВНОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА
ОТ 22.10.2013 Г. № 60
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ САНИТАРНОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ПРАВИЛ СП 3.1.2.3114-13
«ПРОФИЛАКТИКА ТУБЕРКУЛЕЗА»

ПРОФИЛАКТИКА ТУБЕРКУЛЕЗА

СОЦИАЛЬНАЯ

СПЕЦИФИЧЕСКАЯ

САНИТАРНАЯ

СОЦИАЛЬНАЯ

- ОЗДОРОВЛЕНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА И БЫТА
- ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
 - НОРМАТИВНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ МИГРАЦИИ
- БОРЬБА С АЛКОГОЛИЗМОМ И НАРКОМАНИЕЙ, СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОИМУЩИХ, БЕЗДОМНЫХ, ПРИБЫВШИХ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
- СОБЛЮДЕНИЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ НОРМ ВО ФСИН

СПЕЦИФИЧЕСКАЯ

- ИММУНИЗАЦИЯ ВАКЦИНОЙ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ТУБЕРКУЛЕЗА
 - ПРЕВЕНТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ (ХИМИОПРОФИЛАКТИКА)

ВАКЦИНАЦИЮ ПРОВОДЯТ НОВОРОЖДЕННЫМ В УСЛОВИЯХ РОДИЛЬНОГО ДОМА, РЕВАКЦИНАЦИЮ ОДНОКРАТНО В 6-7 ЛЕТ



- МЕРЫ ПО ОГРАЖДЕНИЮ НАИБОЛЕЕ УГРОЖАЕМЫХ КОНТИНГЕНТОВ НАСЕЛЕНИЯ ОТ ПАЦИЕНТОВ С ЗАРАЗНЫМИ ФОРМАМИ ТУБЕРКУЛЕЗА И ОГРАНИЧЕНИЕ ДОПУСКА ЛИЦ, ПАЦИЕНТОВ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ, К РАБОТЕ В НЕКОТОРЫХ ПРОФЕССИЯХ
 - СОЦИАЛЬНЫЕ, ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ И ЛЕЧЕБНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОЧАГАХ ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ИНФЕКЦИИ (ИЗОЛЯЦИЯ ЛИЦ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ ИЗ ОЧАГА ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ИНФЕКЦИИ, ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ). ЗА КОНТАКТНЫМИ ЛИЦАМИ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
 - САНИТАРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ РАБОТА СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ

ОЧАГИ ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ИНФЕКЦИИ

І ГРУППА –

ОЧАГИ С ВЫСОКИМ РИСКОМ ЗАРАЖЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗОМ, ОТЯГОЩЕННЫЕ НЕБЛАГОПРИЯТНЫМИ ФАКТОРАМИ - СОЦИАЛЬНО ОТЯГОЩЕННЫЕ ОЧАГИ

II ГРУППА –

ОЧАГИ ТУБЕРКУЛЕЗА С ВЫСОКИМ РИСКОМ ЗАРАЖЕНИЯ В ОЧАГЕ, СОЦИАЛЬНО БЛАГОПОЛУЧНЫЕ

III **ГРУППА** – очаги туберкулеза с рис

ОЧАГИ ТУБЕРКУЛЕЗА <u>С РИСКОМ</u> ЗАРАЖЕНИЯ В ОЧАГЕ

IV ГРУППА –

ОЧАГИ <u>С ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ РИСКОМ</u> ЗАРАЖЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗОМ

V ГРУППА -

ОЧАГИ ТУБЕРКУЛЕЗА <u>ЗООНОЗНОГО</u> ПРОИСХОЖДЕНИЯ

І ГРУППА - СОЦИАЛЬНО ОТЯГОЩЕННЫЕ ОЧАГИ

БОЛЬНОЙ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ, ВЫДЕЛЯЮЩИЙ МИКОБАКТЕРИИ ТУБЕРКУЛЕЗА



- ПРОЖИВАНИЕ В ОЧАГЕ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ, ЛИЦ С ИММУНОДЕФИЦИТНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
- ТЯЖЕЛЫЕ БЫТОВЫЕ УСЛОВИЯ, ОТСУТСТВИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВЫДЕЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНОГО ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ БОЛЬНОГО
- НАРУШЕНИЯ ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОГО РЕЖИМА, НАРУШЕНИЕ БОЛЬНЫМ ПРАВИЛ ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ

ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ГРАНИЦЫ ОЧАГА - ВКЛЮЧАЕТСЯ <u>КВАРТИРА</u>, В КОТОРОЙ ПРОЖИВАЕТ БОЛЬНОЙ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ С ОБИЛЬНЫМ ВЫДЕЛЕНИЕМ ВОЗБУДИТЕЛЯ ТУБЕРКУЛЕЗА, <u>ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА</u>, ПОДЪЕЗД ДОМА И ГРУППА БЛИЗЛЕЖАЩИХ ДОМОВ, ОБЪЕДИНЕННЫХ ОБЩИМ ДВОРОМ

II ГРУППА - СОЦИАЛЬНО БЛАГОПОЛУЧНЫЕ

БОЛЬНОЙ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ, ВЫДЕЛЯЮЩИЙ МИКОБАКТЕРИИ ТУБЕРКУЛЕЗА



- ПРОЖИВАНИЕ В ОТДЕЛЬНЫХ КВАРТИРАХ БЕЗ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
 - СОБЛЮДЕНИЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЙ РЕЖИМ
 - выполнение мероприятия по текущей дезинфекции

III ГРУППА - С РИСКОМ ЗАРАЖЕНИЯ

- БОЛЬНОЙ АКТИВНЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ БЕЗ УСТАНОВЛЕННОГО ПРИ ПРИНЯТИИ НА УЧЕТ ВЫДЕЛЕНИЯ МИКОБАКТЕРИЙ, НО ПРОЖИВАЮЩИЙ С ДЕТЬМИ И ПОДРОСТКАМИ
- БОЛЬНОЙ С ВНЕЛЕГОЧНЫМИ ЛОКАЛИЗАЦИЯМИ ТУБЕРКУЛЕЗА С ВЫДЕЛЕНИЕМ МИКОБАКТЕРИЙ ТУБЕРКУЛЕЗА И БЕЗ ВЫДЕЛЕНИЯ МИКОБАКТЕРИЙ С НАЛИЧИЕМ ЯЗВ И СВИЩЕЙ

IV ГРУППА — с потенциальным риском заражения

- БОЛЬНОЙ АКТИВНЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ С УСТАНОВЛЕННЫМ ПРЕКРАЩЕНИЕМ ВЫДЕЛЕНИЯ МИКОБАКТЕРИЙ ТУБЕРКУЛЕЗА В РЕЗУЛЬТАТЕ ЛЕЧЕНИЯ (УСЛОВНЫЕ БАКТЕРИОВЫДЕЛИТЕЛИ), ПРОЖИВАЮЩИЙ БЕЗ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ И НЕ ИМЕЮЩИЙ ОТЯГОЩАЮЩИХ ФАКТОРОВ
 - БОЛЬНОЙ, ВЫДЕЛЯЮЩИЙ МИКОБАКТЕРИИ, ВЫБЫЛ
 - БОЛЬНОЙ, ВЫДЕЛЯЮЩИЙ МИКОБАКТЕРИИ, УМЕР

V ГРУППА - очаги зоонозного происхождения

МЕРОПРИЯТИЯ В ОЧАГАХ ТУБЕРКУЛЕЗА – ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НОВЫХ СЛУЧАЕВ ИНФИЦИРОВАНИЯ МИКОБАКТЕРИЯМИ ТУБЕРКУЛЕЗА И ЗАБОЛЕВАНИЙ В ОКРУЖЕНИИ БОЛЬНОГО

ВЫЯВЛЕНИЕ ТУБЕРКУЛЕЗА С УСТАНОВЛЕННЫМ У БОЛЬНОГО ВЫДЕЛЕНИЕМ МИКОБАКТЕРИЙ ТУБЕРКУЛЕЗА И/ИЛИ ФАЗЫ РАСПАДА ТУБЕРКУЛЕЗНОГО ПРОЦЕССА

КЭС В ТЕЧЕНИЕ 3-Х ДНЕЙ

РОСПОТРЕБНАДЗОР И ФТИЗИАТРИЧЕСКАЯ СЛУЖБА

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ОЧАГА

УЧАСТКОВЫЙ ВРАЧ-ФТИЗИАТР И ВРАЧ-ЭПИДЕМИОЛОГ

• УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ЛИЦА, КОНТАКТИРОВАВШИЕ С ЗАБОЛЕВШИМ В СЕМЬЕ, КВАРТИРЕ, ДОМЕ УТОЧНЯЕТСЯ МЕСТО ФАКТИЧЕСКОГО ПРОЖИВАНИЯ И ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ ЗАБОЛЕВШЕГО ПО ДРУГИМ АДРЕСАМ СВЕДЕНИЯ О МЕСТЕ РАБОТЫ (ОБУЧЕНИЯ) БОЛЬНОГО ТУБЕРКУЛЕЗОМ, В ТОМ ЧИСЛЕ, ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ, ПРОФЕССИЯ БОЛЬНОГО

ОЦЕНИВАЕТСЯ СТЕПЕНЬ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ ОЧАГА (РИСК ЗАРАЖЕНИЯ ДЛЯ НАХОДЯЩИХСЯ В НЕМ ЛЮДЕЙ), УСЛОВИЯ БЫТА, УРОВЕНЬ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ НАВЫКОВ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ И ДРУГИХ ЛИЦ, КОНТАКТИРОВАВШИХ С БОЛЬНЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ, НАЛИЧИЕ В ОЧАГЕ ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ, БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН, ЛИЦ, СТРАДАЮЩИХ АЛКОГОЛИЗМОМ, НАРКОМАНИЕЙ, БОЛЬНЫХ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ

КАРТА ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ И НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ОЧАГОМ ТУБЕРКУЛЕЗА

ВРАЧ-ФТИЗИАТР И ВРАЧ-ЭПИДЕМИОЛОГ

- ПЕРВИЧНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ОЧАГА И ЛИЦ, КОНТАКТИРОВАВШИХ С БОЛЬНЫМ В ТЕЧЕНИЕ 14 ДНЕЙ С МОМЕНТА ВЫЯВЛЕНИЯ БОЛЬНОГО
- РАЗРАБОТКА ПЛАНОВ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ДИНАМИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ОЧАГОМ
- ИЗОЛЯЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНОГО ТУБЕРКУЛЕЗОМ
- ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ОЧАГА ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ, БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН
- ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛИРУЕМОЙ ХИМИОТЕРАПИИ ИЛИ ПРЕВЕНТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ КОНТАКТНЫМ ЛИЦАМ, ДИНАМИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ КОНТАКТНЫХ ЛИЦ (ПРОВЕДЕНИЕ ФЛЮОРОГРАФИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ, ТУБЕРКУЛИНОДИАГНОСТИКИ, БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ, ОБЩИХ КЛИНИЧЕСКИХ АНАЛИЗОВ)
- ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ, ТЕКУЩЕЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ И ОБУЧЕНИЕ БОЛЬНОГО И КОНТАКТНЫХ ЛИЦ ЕЕ МЕТОДАМ
- КОНТРОЛЬ ТЕКУЩЕЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ В ОЧАГЕ
- ПЕРВИЧНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ЛИЦ, КОНТАКТИРОВАВШИХ С БОЛЬНЫМ, В ТЕЧЕНИЕ 14 ДНЕЙ С МОМЕНТА ВЫЯВЛЕНИЯ БОЛЬНОГО, ДИНАМИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА КОНТАКТНЫМИ ЛИЦАМИ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ
- ОБУЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ И КОНТАКТНЫХ ЛИЦ ГИГИЕНИЧЕСКИМ НАВЫКАМ
- ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСЛОВИЙ, ПРИ КОТОРЫХ ОЧАГ ТУБЕРКУЛЕЗА МОЖЕТ БЫТЬ СНЯТ С ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО УЧЕТА
- ЗАПОЛНЕНИЕ И ДИНАМИЧЕСКОЕ ВЕДЕНИЕ КАРТЫ, ОТРАЖАЮЩЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКУ ОЧАГА ТУБЕРКУЛЕЗА И ВЕСЬ КОМПЛЕКС ПРОВОДИМЫХ В ОЧАГЕ МЕРОПРИЯТИЙ С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ



ВРАЧ-ФТИЗИАТР

ЕЖЕМЕСЯЧНО

КОНТРОЛЬ ПРАВИЛЬНОСТИ, ПОЛНОТЫ И СВОЕВРЕМЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ КАРТ, ОТРАЖАЮЩИХ ХАРАКТЕРИСТИКУ ОЧАГОВ ТУБЕРКУЛЕЗА, И ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСА ПРОВОДИМЫХ В ОЧАГЕ ТУБЕРКУЛЕЗА САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ (ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ) МЕРОПРИЯТИЙ

ВРАЧ-ФТИЗИАТР И ВРАЧ-ЭПИДЕМИОЛОГ

КРАТНОСТЬ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОЧАГОВ ТУБЕРКУЛЕЗА:

- ДЛЯ ОЧАГОВ 1 ГРУППЫ 4 РАЗА В ГОД
- ДЛЯ ОЧАГОВ 2 ГРУППЫ 2 РАЗА В ГОД
 - ДЛЯ ОЧАГОВ 3 ГРУППЫ 1 РАЗ В ГОД



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!